

MABATEC AMIN

PRESENTACION: 1Lt., 1/2Lt., 1/4Lt.

Nutriente orgánico basado en aminoácidos para uso agrícola, potencializa la actividad fisiológica evitando el estrés de sus cultivos logrando cosechas de calidad y cantidad.

MABATEC AMIN, es un nutriente orgánico compuesto de aminoácidos, polipéptidos y peptonas rápidamente asimilables por la planta. Contiene los siguientes aminoácidos: glicina, prolina, ácido glutámico, alanina, hidroxiprolina, arginina, ácido aspártico, lisina, leucina, valina, fenilalanina, serina, isoleucina, tiroxina, histidina, treonina, metionina, cistina y triptófano correspondiendo a un contenido total de 37.1 de AMINOACIDOS.

Aplicado por la vía foliar le proporciona estos constituyentes básicos que dan origen a las diversas proteínas requeridas en el estado de aplicación obteniéndola así con un ahorro considerable de energía.

Estimula el desarrollo radicular favoreciendo la absorción de nutrientes.

COMPOSICION

DESCRIPCIÓN	P/V
Aminoácidos libres	30.00%
Lignosulfato Vegetal	2.0%
Extracto de Algas Marinas	0.1%

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	RECOMENDACIONES Y MOMENTO DE LA APLICACIÓN
Papa	0.5 - 1	Aplicar luego del 1er aporque haciendo 2 aplicaciones como mínimo cada 15 días
Tomate, Ají, Paprika, Pimiento	0.5 - 1	Aplicar en el almácigo y 15 días después del trasplante. Realizar 3 aplicaciones como mínimo.
Espárrago	0.5 - 1	Aplicar a partir del 3er brote cada 15 días repetir la aplicación durante 3 a 4 veces
Cebolla, Ajo, poro	0.5 - 1	Aplicar 15 a 20 días después del trasplante y repetir a los 15 días
Frutales, Cítricos, Palto, Olivo, mango	1 - 2	Aplicar durante la formación de nuevos brotes al inicio de la floración y al inicio de la fructificación
Vid	0.5 - 1	Aplicar al inicio de la formación de los racimos, cuando tengan 3mm de diámetro y después del raleo
Arroz	0.5 - 1	Aplicar del inicio del macolla miento y en punto de algodón
Algodón	0.5 - 1	Aplicar en la etapa de desarrollo
Caña de Azúcar	0.5 - 1	Aplicar 60 días después del corte
Alcachofa	0.5 - 1	Aplicar 30 días después del trasplante
Maíz	0.5 - 1	35 días después de la siembra y en etapa de desarrollo

1. Miscibilidad

MABATEC AMIN puede ser mezclado con fertilizantes y plaguicidas de uso común excepto los de fuerte reacción alcalina, azufres, polisulfuros compuestos de cobre y aceites minerales.

Igualmente esperar de 8 a 10 días anteriores o posteriores a la aplicación de MABATEC AMIN si desea aplicar algunos productos aquí mencionados.

2. Precauciones

Se sugiere aplicar en las horas tempranas o frescas del día, pulverizando uniformemente.

En invernaderos se sugiere reducir a la dosis recomendada en 20 – 25%.

3. Primeros auxilios

Tras contacto con la piel; lavar con agua

Tras contacto con los ojos; lavar con agua abundante.

Tras ingestión; beber agua abundante.

Inhalación; no irritante.

4. Productos de combustión peligrosos.

Ninguno

5. Medidas a tomar en caso de derrama accidental.

Precauciones personales

Ninguna precaución especial

Precauciones para el medio ambiente

Diluir el producto con agua

Métodos de limpieza.

Limpieza con agua