

MABATEC BIO

(Suspensión concentrada de Algas Marinas, Aminoácidos Vegetales y Promotores Hormonales)

PRESENTACION: 1Lt., 1/2Lt., 1/4Lt.

CARACTERISTICAS:

- Es un bioestimulante de origen natural a base de tres principales promotores de hormonas vegetales (promotores de citoquininas, promotores de giberelinas y promotores de auxinas) que participan en el crecimiento y desarrollo de las plantas adicionalmente contiene micro elementos, extractos de algas marinas y otros compuestos biológicamente activos, contenidos en los extractos vegetales.
- Estimula los diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas como la división y diferenciación celular, translocación de sustancias, síntesis de clorofila, diferenciación de yemas, uniformidad en floración y amarre de flores y frutos.
- Por su composición de microelementos y otros nutrientes dará una adecuada y balanceada nutrición a las plantas, lográndose mejorar la calidad de los frutos e incrementar los rendimientos.

COMPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN	P/P
Calcio (CaO)	0.30%
Magnesio (MgO)	0.20%
Azufre (S)	0.20%
Hierro (Fe)	0.50%
Manganeso (Mn)	0.20%
Zinc (Zn)	0.40%
Boro (B)	0.30%
Extracto de Algas Marinas	3.00%
Lignosulfonato Vegetal	2.00%
Extracto de origen Vegetal	65.00%
Promotor de cito quininas	83 ppm
Promotor de Giberelinas	33 ppm
Promotor de Auxinas	33 ppm
inertes	18.90%

DOSIS:

CULTIVO	DOSIS (L/Ha)	RECOMENDACIONES Y MOMENTO DE LA APLICACION
Alcachofa	0.5	Aplicar 30 días después de transplante repetir 20 días después de la segunda aplicación.
Papa	0.5	Aplicar al inicio de la formación de tubérculos y repetir a los 15 – 30 días.
Esparrago	0.45 - 0.5	Aplicar en el primer y segundo brotamiento.
Arroz	0.45 - 0.5	Aplicar 30 días después después del transplante, repetir 20 días después de la segunda aplicación.
Hortalizas, Maíz	0.5	Aplicar a los 30 a 45 días después de la siembra y repetir a los 15 – 30 días.
Leguminosas	0.45 - 0.5	Aplicar 30 días después de la siembra y pre floración.
Tomate, Aji, Pimiento, Paprika	0.5	Aplicar al inicio de la floración y repetir a la aparición de frutos.
Vid	0.5 - 0.75	Aplicar al inicio de la floración y a los 15 – 30 días después.
Cucurbitáceas, Algodón	0.45 - 0.5	Aplicar 30 – 45 días después de la siembra, repetir 20 días después de la segunda aplicación
Café, Cacao	0.45 - 0.5	Aplicar al inicio del brotamiento y en pre - floración.
Cítricos, Frutales (Palto, MANGO, Manzano)	0.5 - 0.75	Aplicar en el brotamiento, repetir 20 días después y en pre floración

RECOMENDACIONES:

Recuerde que las plantas no deben estar dañadas físicamente y que las condiciones de humedad del suelo deben ser apropiadas.

PRECAUCIONES:

- Terminadas las labores de aplicaciones lavarse con abundante agua y jabón.
- Utilice por precaución equipos de protección personal (guantes, botas, etc.).
- No permita el ingreso a personas ni animales a campos recién tratados.
- Los envases no deben ser utilizados para ningún otro propósito, inutilícelo en forma inmediata y almacénelos en lugares destinados por las autoridades competentes.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalina. Es compatible con los productos para la protección vegetal sin embargo se recomienda realizar pruebas a nivel de campo.