

MABATEC CYTO

(PROMOTORES DE CITOQUININA)

PRESENTACION: 1Lt., 1/2Lt, 1/4Lt.

CARACTERISTICAS:

- Es un bioestimulante a base de promotores de citoquinina, lignosulfato vegetal, aminoácidos, extracto de algas marinas, macro y micro elementos que ayudan a incrementar el rendimiento de los cultivos.
- Produce un crecimiento equilibrado de las hojas, tallos, raíces y frutos, obteniendo con esto mayor rendimiento y mejor calidad de cosechas.
- Estimula el brotamiento y crecimiento de las raíces, estimula el desarrollo de yemas auxiliares o ramas, promueve la floración mejora la retención y formación de frutos, mejora la producción de semillas incrementa la resistencia al estrés ambiental y al ataque de plagas y enfermedades.
- Es recomendado para reducir los efectos de estrés severo en las plantas como sequías, heladas, exceso de sal, etc.

COMPOSICION

Promotores de Citoquininas.....	1500ppm
Lignosulfato Vegetal.....	2.00%
Aminoácidos.....	2.00%
Extractos de Algas Marinas.....	5.00%
Magnesio (MgO).....	0.20%
Azufre (S).....	0.20%
Hierro (Fe).....	0.50%
Manganeso (Mn).....	0.20%
Zinc (Zn).....	0.40%
Boro (B).....	0.10%
Densidad.....	1.20-1.25 g/ml.
PH.....	3.5-5.5

CULTIVOS	DOSIS (LT/HA)	NUMERO DE APLICACION	RECOMENDACIÓN Y MOMENTOS DE APLICACION
Algodón	1.0	2	Al inicio de floración e inicio de botoneo
Frutales y cítricos	1.0	3	Al inicio de floración con frutos de 2-3cm en el cambio de color
Arroz	1.0	2	En punto de algodón y al espigado
Café	1.0	2	Al inicio de floración y cuando el grano empieza a cambiar de color
Caña de Azúcar	1.0	2	Al macollamiento y a la formación de azúcar
Aj. Pimiento. Tomate. Paprika	1.0	3	Al inicio de floración, al inicio de fructificación y en el cambio de color
Hortalizas	1.0	2	Cuando tenga de 2-8 hojas y 2 semanas después
Papa y camote	1.0	3	Al momento del estoloneo, inicio de tuberización y en crecimiento de tubérculo
Vid	1.0	4	Cuando el brote tenga 20-30cm, después del cuajado, con bayas en desarrollo y postcosecha
Esparrago	1.0	3	Al inicio del 1er., 2do. y 3er. brote
Alcachofa. Brócoli.	1.0	3	A los 60, 90 y 120 días

Coliflor			
Palto, Mango	1.0	3	Al inicio de la floración, al inicio de la fructificación y en el llenado
Fresa	1.0	4	Al inicio de la floración, con intervalos d 25 días
Ajo, Cebolla	1.0	3	Luego del transplante, al inicio del bulbeo y en pleno llenado del bulbo
Frejol, Haba. Arveja	1.0	3	Al inicio de la floración, al momento de cuajado, en el desarrollo de vainas

PRECAUCIONES:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizante foliar, bioestimulante y/o regulador de crecimiento.

NOTA AL COMPRADOR:

La empresa garantiza que el producto contenido en este embace, concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para los usos recomendados siguiendo las indicaciones.