

MABATEC MAGNESIO

(COREECTOR DE DEFICIENCIA DE MAGNESIO)

PRESENTACION: 1Lt

GENERALIDADES:

- Es un fertilizante foliar con una alta concentración de Magnesio, enriquecido con Lignosulfonatos Vegetales y Ácidos Policarboxílicos. Proporciona un nivel adecuado de Magnesio en la planta, siendo este elemento parte esencial de la clorofila, necesaria para la formación de azúcar; actúan como portador de fósforo y ayuda a regular otros nutrientes.
- Contenido Lignosulfonatos Vegetales y Ácidos Policarboxílicos que son los transportadores, que mejoran la asimilación y aprovechamiento del Magnesio por la planta.

COMPOSICION:

p/v

MAGNESIO (MgO)	8.30
Lignosulfonato Vegetal	1.00
Ácidos Policarboxílicos	0.50
Densidad	1.22 – 1.26 g/ml
PH	2.8 – 3.8

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (L/200)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Frutales, Cítricos, Palto, Mango	1.5 – 3 L/ha	Aplicar en mezclas con los fertilizantes foliares y plaguicidas de usos frecuentes.
Hortalizas	0.5 – 1	Aplicar cuando la planta se encuentra en desarrollo y crecimiento.
Papa	0.5 – 1	Aplicar en mezcla con los fertilizantes foliares y plaguicidas de usos frecuentes.
Leguminosas	0.5 – 1	Aplica desde los 25 días después de la emergencia de las plantas y repetir una al aporte, otra al inicio de la floración y una cuando las vainas comienzan a crecer.
Arroz	0.5 – 1	Aplicar en el almacigo antes del trasplante, al inicio del macollos y en punto de algodón.
Banano	0.5 – 1	Aplicar desde el inicio de crecimiento del hijuelo repitiendo 3 a 4 veces hasta el inicio de la fructificación
Vid	0.5 – 1	Al inicio del brotamiento y repetir 3 a 4 veces.
Espárrago	0.5 – 1	Al inicio de cada brote y con los plaguicidas de uso frecuentes.
Tomate, Ají, Paprika, Pimiento	0.5 – 1	15 días después del trasplante y al inicio de cada floración, repetir en el crecimiento del fruto.
Olivo	0.5 – 1	Desde el inicio del crecimiento vegetativo en mezcla con los fertilizantes foliares y plaguicidas de uso frecuente.
Maíz	0.5 – 1	Aplicar a los 40 – 60 días después de la siembra.
Algodón	0.5 – 1	Aplicar a los 45 – 50 días de la siembra.

**RECOMENDACIONES:**

No aplicar en horas de fuerte insolación y/o con presencia de fuertes vientos, es preferible aplicar en horas de la tarde.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de reacción alcalinas. Es compatible con los productos para la protección vegetal sin embargo se recomienda realizar pruebas a nivel de campo.

PRECAUCIONES:

- Terminados las labores de aplicación del producto se recomienda lavarse con abundante agua y jabón.
- Utilice por precaución equipos de protección personal (guantes, botas, etc.).
- No permita el ingreso de personas ni animales a campos recién tratados.
- Los envases vacíos no deben ser utilizados para ningún otro propósito, destrúyalos en forma inmediata y almacenarlos en lugares destinados por las autoridades competentes.

NOTA AL COMPRADOR:

La empresa garantiza que el producto contenido en este envase original concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para los usos recomendados siguiendo las indicaciones dadas.