

MABATEC RAIZ

(ENRAIZADOR DE PLANTAS)

PRESENTACION: 1Lt.

CARACTERISTICAS:

- Es un enraizador a base de Lignosulfonatos vegetales, Zinc, Aminoácidos y Promotores de Auxinas que promueven el enraizamiento y la rápida formación de raíces.
- Esta enriquecido de Lignosulfonatos vegetales que mejoran la asimilación y translocación del producto en la planta.
- Contiene Zinc micronutrientes que es requerido para la formación del Triptófano, aminoácido que es considerado esencial para la síntesis de Auxinas. La Auxina es una hormona vegetal que participa en la formación de nuevas raíces y el enraizamiento.
- Contiene precursores de Auxinas, los cuales estimularan el enraizamiento y la emisión de raíces en las plantas.
- Está enriquecido con Aminoácidos libres, los cuales darán una rápida recuperación de las plantas después del estrés causado por el trasplante.

COMPOSICION:

	%
Zinc (Zn)	2.00
Lignosulfonato Vegetal	20.00
Aminoácidos Libres	5.00
Promotores de Auxinas	0.25
Densidad:	1.15 – 1.20g/MI
PH	4.5 – 5.5

DOSIS:

Aplicación al follaje (aspersión foliar), inmersión de plántulas: 0.5 – 1L/200 de agua.

Aplicación al suelo (drench o por sistema): 11 – 2L/ha.

CULTIVO	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE LA APLICACION
Papa	Aplicar en el tratamiento de semillas y luego realizar una aplicación foliar a los 30 días de la emergencia.
Algodón	Aplicar después del deshielo (drench) y repetir a los 15 días siguientes.
Tomate, Ají, Paprika, Piquillo	Aplicar al momento del transplante en el tratamiento de las raíces (drench) y foliarmente después de 15 días del transplante.
Brócoli, Coliflor, Alcachofa	Aplicar al momento del transplante a las raíces (drench) y foliarmente 15 días después del transplante.
Lechuga, Apio, Col	Aplicar desde los 15 días después del transplante (drench o sistema) y repetir una aplicación foliar 15 días después.
Esparrago	Aplicar al momento de la siembra de las coronas (drench o sistema) y foliarmente al inicio de cada nuevo brote.
Frutales, Cítricos, Melocotonero, Vid, Olivo, Manzano, Especies, Forestales	Sumergir estacas por 5 minutos, luego ponerlos en bolsas y/o camas de enraizamiento de viveros.
Flores, Clavel, Gypsophilla	Sumergir esquejes por 5 minutos y ponerlos en las camas de enraizamiento.
Caña de Azúcar, Maíz, Arroz	En las etapas iniciales de siembra, transplante o inicio de campaña y repetir en las etapas críticas de mayor necesidad de nutrientes.
Caña, Café, Palma Aceitera, Papaya	En las etapas iniciales de siembra, transplante o inicio de campaña y repetir en las etapas críticas de mayor necesidad de nutrientes.

**PRECAUCIONES:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinales, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.

RECOMENDACIONES:

De preferencia se recomienda aplicar este producto solo en el tanque, realizar una prueba de compatibilidad a la aplicación.

NOTA AL COMPRADOR:

La empresa garantiza que el producto contenido en este envase, concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y es apto para los usos recomendados siguiendo las indicaciones dadas.