

MABATEC SULCOB

PRESENTACION: 1Lt, 1/2Lt, 1/4Lt

COMPOSICIÓN

COBRE (Cu).....	6.20%
LIGNOSULFATO VEGETAL.....	2.00%
EXTRACTO DE ALGAS MARINAS.....	0.50%
DENSIDAD: 1.25-1.30 g/MI	
pH: 2.0-3.0	

CARACTERÍSTICAS

MABATEC SULCOB es un inductor de defensa Fúngico – Bacteriano con acción bioestimulante, a base de Cobre en forma de Sulfato de Cobre penta-hidratado, Extracto de Algas Marinas y Lignosulfonato Vegetal. Su contenido de Cobre ayuda a prevenir y corregir deficiencias de este elemento y participa en la formación de fotosíntesis. Contiene en su formulación Algas Marinas, que aportan fitohormonas naturales (Citoquininas, Auxinas y Giberelinas). MABATEC SULCOB, incrementa el contenido de compuestos fenólicos y fitoalexinas en todos los cultivos que sirven de defensa natural de la planta contra los agentes patógenos.

Es un producto sistémico, gracias a la presencia del Lignosulfonato Vegetal en la formulación que permiten una mayor y rápida absorción, así como una eficiente translocación y aprovechamiento por el cultivo. Puede aplicar via aspersión foliar y drench a cuello de planta. Produce la inducción de defensas para los siguientes patógenos:

HONGOS: Botrytis sp, Oidium sp, Phytophthora sp, Septoria sp, Rhizopus sp, Penicillium sp, Cercospora sp, Alternaria sp, Melanconium sp, Plasmopara sp, Uromyces sp, Fusarium sp.

BACTERIAS: Erwinia sp, Pseudomonas sp, Xanthomonas sp.

DOSIS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN:

CULTIVOS	DOSIS(L/200)	RECOMENDACION
Frutales Cítricos, mango, palta, manzana, melocotón, olivo, vid, papaya.	2-3	Aplicar a la aparición de nuevos brotes y repetir la aplicación con intervalos de 15 días.
Hortícola y otros Tomate, ají, páprika, espárrago, brócoli, frijoles, zapallo, sandía, pepino, papa, cebolla, ajo.	0.5	Luego del trasplante, al inicio de la floración y en fructificación, hacer tres aplicaciones como mínimo.
Arroz, Maíz,	0.3-0.5	Iniciar las aplicaciones en almácigo y en macollamiento Repetir lo necesario cada 15 días.
Fresa, flores, rosas	0.5	Aplicar al inicio del cultivo, al inicio de la floración y repetir lo necesario cada 15 días.

Puede ser aplicados en cultivos, hortícola, frutales, ornamentales e industriales. Para asegurar una mejor translocación se recomienda aplicar cuando el cultivo está en pleno desarrollo después de un riego o una lluvia. Para situaciones de estrés, en las primeras horas de la mañana.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con productos de reacción alcalina. Es compatible con los productos para la protección vegetal, sin embargo se recomienda pruebas a nivel de campo.

RECOMENDACIÓN

Puede ser utilizado en aplicaciones foliares y vía sistema de riego por goteo o aspersión.

TRATAMIENTO DE URGENCIA

En caso de ingestión inducir el vómito y llamar al médico inmediatamente. En el caso de contacto con la piel y los ojos lavase las partes afectadas con abundante agua fresca.